

BETAMI Study



BEta-Blocker **T**reatment after
Acute **M**ycocardial **I**nfarction

HUSK Å VURDERE HJERTEINFARKTPASIENTEN FOR BETAMI FØR DU SKRIVER UT BETABLOKKER

Inklusjonskriterier

- ≥ 18 år
- Diagnostisert med STEMI eller NSTEMI type 1
- PCI behandlet culprit-lesjon eller trombolyse (STEMI) under sykehusinnleggelsen
- Forventet bosatt i Norge i studieperioden

Eksklusjonskriterier

- **Pasienter med tilstander hvor β -blokker-behandling er påkrevet (ikke begrenset til):**
 - Arytmier – alle ventrikulære samt afl/aflu hvor det ikke foreligger andre behandlings alternativer
 - Hypertensjon hos pasienter som allerede står på 3 eller flere antihypertensiva
 - Kardiomyopati
 - Klinisk diagnose av hjertesvikt (i praksis skal alle disse ha vscan/ekko) eller EF $< 40\%$
 - Signifikant VV akinesi og/eller tromber uavhengig av EF
- **Kontraindikasjoner til β -blokker behandling (ikke begrenset til):**
 - Bradykardi og hypotensjon
 - Tidligere bivirkninger som har medført seponering (NB: reelle bivirkninger)
 - Komorbide tilstander (bl.a. alvorlig perifer karsykdom og KOLS grad 4)
- **Andre**
 - Terminal sykdom og aktiv kreftsykdom med og kort forventet levetid
 - En hver tilstand (som psykose, demens) eller situasjon som medfører risiko for pasienten eller influerer studie resultatene
 - Kvinner i fruktbar alder

Ta gjerne kontakt med sentral studiekoordinator Arnhild Bakken (tlf. 94815970) ved spørsmål om studien eller ved usikkerhet om pasienten kan inkluderes. Informasjon om studien finnes også på www.betami.org.